

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در جهان :

- حدود 310 میلیون نفر در جهان مبتلا به هپاتیت های B و C
 - ✓ 240 میلیون مورد هپاتیت B
 - ✓ 71 میلیون مورد هپاتیت C
 - ✓ آزمایش و درمان برای اکثر این افراد در جهان در دسترس نیست و به همین دلیل:
 - ✓ تنها 10٪ افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن، تشخیص داده شده و 22٪ درمان دریافت می کنند
 - ✓ تنها 9.400.000 مبتلا به هپاتیت C تحت درمان قرار دارند.(13٪)
 - ✓ سالانه 1/4 میلیون مرگ به دلیل سیروز و سرطان کبد در جهان رخ دهد. 47 درصد این موارد بر اثر هپاتیت B ، 48 درصد به دلیل هپاتیت C و بقیه موارد متناسب به سایر هپاتیت ها است.
 - ✓ در سال 2017 موارد ابتلا به هپاتیت B 2850000 نفر بوده است.

اهداف سازمان بهداشت جهانی در جهت حذف هپاتیت :

- اهداف سازمان بهداشت جهانی، حذف هپاتیت های ویروسی تا سال 2030 است.
 - ✓ کاهش 90 درصدی موارد جدید ابتلای به هپاتیت های B و C ،
 - ✓ دسترسی همگانی به درمان های کلیدی تا 80 درصد، که این دسترسی می تواند مرگ های مرتبط با هپاتیت را تا 65 درصد کاهش دهد.

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در ایران - هپاتیت B

شیوع هپاتیت B

- در حالیکه مناطق مختلف جهان از لحاظ شیوع هپاتیت B به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
 - ✓ 1. نواحی با شیوع کم (میزان شیوع کمتر از 2 درصد)
 - ✓ 2. نواحی با شیوع متوسط (میزان شیوع 2-8 درصد)
 - ✓ 3. نواحی با شیوع بالا (میزان شیوع بالای 8 درصد)
- ایران در حال حاضر جزو کشورهای با شیوع نسبتاً کم هپاتیت B محسوب میشود . شیوع عفونت در جمعیت عمومی کمتر از 1.5٪ است و روند کاهشی هپاتیت B در کشور دیده می شود .

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در ایران - هپاتیت B

بروز هپاتیت B

جدول فراوانی بیماران مبتلا به هپاتیت B بر اساس سال تشخیص بیماری

سال تشخیص	فراوانی	بروز (در صد هزار نفر)
1395	8958	11.2
1396	8541	10.7
1397	8751	10.9
1398	7163	8.7
1399	4931	6
1400	5429	6.4
1401	3278	4

آخرین وضعیت هیپاتیت های ویروسی در ایران - هیپاتیت C

شیوع هیپاتیت C

- کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی در قالب 6 منطقه جغرافیایی (منطقه اروپا، منطقه افریقا، منطقه امریکا، منطقه جنوب شرق آسیا، منطقه غرب اقیانوس آرام، و منطقه مدیترانه شرقی) تقسیم شده اند. ایران در منطقه مدیترانه شرقی قرار دارد. در حالیکه در این منطقه کشورهایی چون کویت، عربستان سعودی، قطر، و امارات قرار دارند، کمترین میزان شیوع هیپاتیت C مربوط به ایران است. تمرکز اصلی شیوع هیپاتیت C در ایران، در گروههای پرخطر قرار دارد و به همین دلیل تمرکز اصلی برنامه های تشخیصی - درمانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روی این گروهها قرار گرفته است.

آخرین وضعیت هیپاتیت های ویروسی در ایران - هیپاتیت C

بروز هیپاتیت C

سال تشخیص	فراوانی	بروز (در 100/000 نفر)
1395	2434	3
1396	2521	3.1
1397	2624	3.2
1398	2594	3.1
1399	2151	2.6
1400	2451	2.9
1401	2434	3

شیوع هپاتیت های مزمن B و C در ایران :

شیوع هپاتیت C مزمن (درصد)	شیوع هپاتیت B مزمن (درصد)	جمعیت
3/0	1	جمعیت عمومی
30	5/2	معتادان تزریقی IDU
9/5	5/2	زندانیان
5/7	5/1	زنان آسیب پذیر FSW

وضعیت هپاتیت های ویروسی مزمن B و C در دانشگاه مشهد :

سال تشخیص	فراوانی	بروز B (در 100/000 نفر)
1399	162	3.3
1400	309	5.7
1401	549	10
1402	1100	21
1403	579	11
سال تشخیص	فراوانی	بروز C (در 100/000 نفر)
1399	184	3.9
1400	119	2.4
1401	192	4
1402	297	6
1403	438	9

براساس تخمین میزان شیوع هپاتیت B 1 درصد و میزان شیوع هپاتیت C 0.3 درصد می باشد.

وضعیت کل موارد شناسایی در دانشگاه مشهد تا پایان 1403 برای هپاتیت B 0.19 درصد (10575 نفر) و برای هپاتیت C 0.03 درصد (1700 نفر) می باشد.

شناسایی و درمان بیماران مبتلا به هپاتیت سی از 5 سال پیش در کمپها حدود 1500 نفر شناسایی شده اند که درمان قطعی انجام شده است.