



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وضعیت هپاتیت های B و C در جهان، ایران و خراسان رضوی

معاونت بهداشتی

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر

روز جهانی هپاتیت

- ۲۸ جولای (۶ مردادماه) روز جهانی هپاتیت و هفته کشوری هپاتیت اول آبان نامگذاری شده است تا از این طریق آگاهی از هپاتیت های ویروسی افزایش یابد.
- شیوع هپاتیت حاد با علت نامشخص در کودکان برخی کشورها، توجه بیشتری را به عفونتهای ویروسی حاد در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان فراخوانده است.
- تلاشهای جهانی، حذف هپاتیت های ویروسی B و C و D را اولویت قرار داده است. شکل مزمن این سه هپاتیت، مسئول بیش از ۹۵٪ مرگهای ناشی از هپاتیت است.
- مشاوره و ابزار تشخیصی، درمانی و پیشگیری از هپاتیت های مزمن ویروسی اغلب دور از دسترس افراد و گاهی صرفا در بیمارستانها متمرکز است.

World Hepatitis Day 2025

شعار روز جهانی هپاتیت

"پیش بسوی حذف هپاتیت"

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در جهان

- حدود ۳۵۴ میلیون نفر در جهان مبتلا به هپاتیت های B و C
 - ✓ ۲۹۶ میلیون مورد هپاتیت B
 - ✓ ۵۸ میلیون مورد هپاتیت C
 - ✓ **آزمایش و درمان برای اکثر این افراد در جهان در دسترس نیست و به همین دلیل:**
 - ✓ تنها ۱۰٪ افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن، تشخیص داده شده و ۲۲٪ درمان دریافت می کنند
 - ✓ تنها ۹.۴۰۰.۰۰۰ مبتلا به هپاتیت C تحت درمان قرار دارند کمتر از ۲۰ درصد
- ۱.۲۰۰.۰۰۰ مرگ در سال ناشی از عفونت های هپاتیت B و C

اهداف سازمان بهداشت جهانی در جهت حذف هپاتیت

- هدف سازمان بهداشت جهانی، **حذف هپاتیت های ویروسی تا سال ۲۰۳۰** است. در راستای دسترسی به این هدف، سازمان بهداشت جهانی دسترسی به **اهداف زیر را تا سال ۲۰۳۰** برای کشورها در نظر گرفته است:
 - ✓ دسترسی همگانی به درمانهای کلیدی برای هپاتیت های ویروسی B و C تا ۸۰ درصد
 - ✓ کاهش ۹۰ درصدی عفونتهای جدید هپاتیت های B و C،
 - ✓ کاهش ۶۵ درصدی مرگ به دلیل هپاتیت

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در ایران – شیوع هپاتیت B

- درحالیکه مناطق مختلف جهان از لحاظ شیوع هپاتیت B به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

✓ ۱. نواحی با شیوع کم (میزان شیوع کمتر از ۲ درصد)

✓ ۲. نواحی با شیوع متوسط (میزان شیوع ۲-۸ درصد)

✓ ۳. نواحی با شیوع بالا (میزان شیوع بالای ۸ درصد)

ایران در حال حاضر جزو کشورهای با شیوع نسبتاً کم هپاتیت B محسوب میشود . شیوع عفونت در جمعیت عمومی کمتر از ۱٪ است و روند کاهشی هپاتیت B در کشور دیده می شود .

آخرین وضعیت هپاتیت های ویروسی در ایران – شیوع هپاتیت C

- کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی در قالب ۶ منطقه جغرافیایی (منطقه اروپا، منطقه افریقا، منطقه امریکا، منطقه جنوب شرق آسیا، منطقه غرب اقیانوس آرام، و منطقه مدیترانه شرقی) تقسیم شده اند. **ایران** در منطقه مدیترانه شرقی قرار دارد. در حالیکه در این منطقه کشورهایی چون کویت، عربستان سعودی، قطر، و امارات قرار دارند، کمترین میزان شیوع (۰.۳ درصد) هپاتیت C مربوط به ایران است. تمرکز اصلی شیوع هپاتیت C در ایران، در گروههای پرخطر قرار دارد و به همین دلیل تمرکز اصلی برنامه های تشخیصی – درمانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روی این گروهها قرار گرفته است.